



AgroGARLIC

Insecticida

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

Extracto de Ajo 9.0%
(Equivalente a 91.65 en g. i.a./L)

Ingrediente Inerte:

Diluyentes y acondicionadores 91.0%

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo: Extracto de Ajo

Categoría Toxicológica: V

Propiedades Físicas: Concentrado emulsionable

Descripción:

AgroGARLIC® es un repelente de origen natural, elaborado con extracto acuoso de *Allium sativum*.

USOS

Cultivos	Plagas	Dosis	Recomendaciones
Berenjena (0) Chile (0) Jitomate (0) Okra (0) Tomate verde (0) Papa (0) Pimiento morrón (0)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Trips (<i>Thrips sp.</i>)	1.0 - 3.0 L/ha	<ul style="list-style-type: none">- Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al detectar la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 250 L de agua/ha- Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de la siembra.

() I. de S.: días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha.
El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 4 horas después de su aplicación.

MODO DE ACCIÓN

AgroGARLIC® se clasifica como un insecticida botánico con propiedades de repelencia, supresión de apetito, enmascaramiento y alteración de las funciones oleo-receptoras de las plagas provocando confusión en su reproducción y alimentación.

Por su naturaleza AgroGARLIC®, es un producto que se recomienda ampliamente para ser usado dentro de un programa de manejo integrado de plagas (MIP), ya que coadyuva a otras formas de control como el químico, cultural y legal.

MÉTODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Mezclar AgroGARLIC® con suficiente agua para obtener una buena cobertura del cultivo. Utilice siempre agua limpia y manténgala a un pH de 5.5 a 7. Agregue la dosis necesaria según el requerimiento de la superficie y mantenga una agitación constante, para obtener una mezcla homogénea.

INSTRUCCIONES Y DOSIS DE APLICACIÓN

Aplicar de una manera preventiva y en cuanto inicien las primeras infestaciones de la plaga. El volumen de agua necesario por hectárea dependerá del desarrollo del cultivo. Dependiendo del grado de infestación se recomienda aplicar de 1.5 - 3 litros por hectárea buscando siempre que las condiciones de viento y temperatura sean las más adecuadas, y a intervalos de 7 a 14 días.

CONTRAINDICACIONES

La mezcla preparada deberá ser aplicada el mismo día y durante las horas más frescas del día.

COMPATIBILIDAD Y FITOTÓXICIDAD

AgroGARLIC® puede ser mezclado con insecticidas, adherentes y otros productos biológicos, no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L, 5 L y 20 L.

Qualtium® garantiza que los productos etiquetados con su logo distintivo han sido sometidos a estrictas normas de evaluación periódica, para sustentar la calidad y la efectividad de sus ingredientes activos, bajo las diversas circunstancias agrícolas ordinarias a las que se aplica cada producto específico.

